



INFEZIONI BATTERICHE SESSUALMENTE TRASMESSE (IBST)

Test di laboratorio anonimi e gratuiti

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) sono causate da batteri, funghi, virus che si trasmettono attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale) per contatto con i liquidi organici infetti (sperma, secrezioni vaginali, sangue, saliva). Le IST interessano, a livello mondiale, milioni di individui ogni anno. I giovani tra 15 e i 24 anni rappresentano la fascia di età più esposta al rischio di contrarre queste infezioni. Le IST più diffuse e curabili sono quelle causate da batteri (IBST) quali: *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Treponema pallidum* e *Trichomonas vaginalis*. Alcune IST possono causare sintomi quali prurito, bruciore, ulcere o perdite dalle mucose genitali, ma frequentemente non provocano sintomi particolari. Anche in assenza di sintomatologia si può trasmettere l'infezione al partner.

Ureaplasma
Mycoplasma
Trichomonas vaginalis
Escherichia coli
Proteus
Pseudomonas
Gardnerella
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis
Neisseria gonorrhoeae
Streptococcus agalactiae
Candida
Chlamydia trachomatis

Test gratuiti
per:

LE IST SI POSSONO PREVENIRE

- **UTILIZZA** il profilattico dall'inizio alla fine del rapporto sessuale
- **EVITA** il contatto diretto con sangue potenzialmente infetto
- **EFFETTUA** visite mediche periodiche di controllo per evidenziare infezioni asintomatiche
- **ESEGUI** i test consigliati dal medico per una diagnosi precoce
- **EFFETTUA** le vaccinazioni prescritte e consigliate dal medico curante

Info:

Referenti del progetto:

Prof.ssa Stefania Marsico (stefania.marsico@unical.it)

Dott. Michele Pellegrino (michele.pellegrino@unical.it)

Consultorio Familiare ASP di Cosenza
presso Cubo 34B (2° piano)
Università della Calabria

Per prenotarsi telefonare allo
0984.496202
dal lunedì al venerdì



RICORDA

- La pillola anticoncezionale, la spirale o la legatura delle tube servono solo ad evitare una gravidanza ma non proteggono dalle IST
- Molte IST sono curabili con una semplice terapia prescritta dal medico
- La diagnosi precoce è importante per evitare possibili complicanze e la diffusione del contagio
- La terapia e i controlli sono consigliati anche al partner